

Vaccination gratuite rattrapage à partir de 13 ans. Donnez-vous votre consentement ?

Cher parent/tuteur,



Votre enfant n'a pas encore reçu certains vaccins. Le CLB (Centre d'accompagnement des élèves) peut les administrer gratuitement à l'école.

Il s'agit des vaccins marqués d'une croix :

- ☐ ... vaccin(s) contre **le tétanos, la diphtérie et la coqueluche**
- ☐ ... vaccin(s) contre **la polio**
- ☐ ... vaccin(s) contre **la rougeole, oreillons et rubéole¹**
- ☐ ... vaccin(s) contre **l'hépatite B**
- ☐ ... vaccin contre **les méningocoques**
- ☐ ... vaccin(s) contre **le papillomavirus humain (HPV)**

Nous sollicitons votre accord. Parlez-en avec votre enfant. Merci de votre collaboration!

À propos de ces vaccins



Une injection dans le haut du bras par vaccin.



Deze vaccins zijn **heel veilig**. Een vaccin kan bijwerkingen hebben: rode zwelling aan de arm, pijn op de plaats van de prik, lichte koorts of een ziek gevoel, minder eetlust, braken of diarree. Lichte bijwerkingen van het vaccin gaan vanzelf weg. De kans dat deze vaccins een zware bijwerking veroorzaken, is heel klein.



Les vaccinations sont **gratuites**.



La vaccination à l'école est effectuée par **un médecin ou une infirmière** du CLB. Vous pouvez également vous rendre chez votre médecin traitant. Dans ce cas, vous devrez payer la consultation.

Vous avez des questions sur cette vaccination ?

Appelez le CLB de votre école au **02 479 25 05**

¹ Le vaccin contre la rougeole, les oreillons et la rubéole n'est pas administré pendant la grossesse. Utilisez un moyen de contraception fiable jusqu'à un mois après la vaccination.

➡ Remplissez le formulaire. Demandez à votre enfant de le remettre à l'école



Les données de l'enfant

Nom + prénom de l'élève :

Date de naissance : .../.../..... École + classe



Autorisation de vaccination par le CLB ?

- ☐ **Oui.**
- ☐ Non, mon enfant a déjà reçu ce vaccin le
- ☐ Non, je veux faire vacciner mon enfant par le **médecin de famille.**
- ☐ Non, je ne veux pas faire vacciner mon enfant.



Attention : votre enfant présente-t-il un risque de réaction grave après le vaccin ? *Réaction allergique grave = gonflement de la bouche ou de la gorge, et/ou difficulté à respirer et/ou problèmes cardiaques.

Votre enfant a-t-il déjà eu **une réaction grave** après une vaccination ? ☐ oui ☐ non

Votre enfant est-il **allergique*** à la néomycine, à la streptomycine ou à la polymyxine B (antibiotiques) ? ☐ oui ☐ non

Votre enfant est-il **allergique*** à l'ingestion ou à l'inhalation de levure (Saccharomyces cerevisiae) ? ☐ oui ☐ non

Votre enfant est-il **allergique*** à la gélatine ? ☐ oui ☐ non

Votre enfant présente-t-il une **immunodéficience grave** (par exemple, cancer, tuberculose, VIH, traitement par des médicaments immunosuppresseurs) ? ☐ oui ☐ non

Votre enfant a-t-il reçu des **produits sanguins ou des immunoglobulines** au cours de l'année passée ? ☐ oui ☐ non

Votre enfant souffre-t-il d'**épilepsie non contrôlée** ? ☐ oui ☐ non

Nom et signature du parent ou du tuteur légal²

.....
Numéro de téléphone où l'on peut vous joindre pendant la journée

Date

² Je soussigné(e) déclare que, en cas d'autorité parentale conjointe, ce choix est le fruit d'une concertation et d'un accord avec l'autre parent, ou que je détiens l'autorité parentale exclusive.

À propos des vaccins



La poliomyélite (paralysie infantile) peut provoquer une paralysie irréparable.

La diphtérie (croup) peut provoquer une inflammation sévère de la gorge et des voies respiratoires avec un risque de d'étouffement. Le cœur et les nerfs sont aussi parfois touchés.

Le tétanos bloque les nerfs. Cela provoque des crampes musculaires très douloureuses. Cela peut parfois empêcher de respirer.

La coqueluche (pertussis) provoque une forte toux et une respiration sifflante. C'est une maladie grave, surtout pour les bébés.

La rougeole provoque de la fièvre et des éruptions cutanées. Parfois, elle provoque une infection de l'oreille ou des poumons. Très occasionnellement, il y a aussi une infection du cerveau. Celle-ci peut être fatale ou provoquer des lésions permanentes. La rougeole est très contagieuse.

Les oreillons provoquent parfois une inflammation du cerveau (membrane) ou des testicules.

La rubéole provoque de la fièvre et des éruptions cutanées. Elle est particulièrement dangereuse chez les femmes enceintes, car elle peut entraîner une fausse couche ou des malformations chez le bébé. Pour éviter la propagation du virus dans la population, nous vaccinons les garçons et les filles.

L'hépatite B est une inflammation du foie causée par le virus de l'hépatite B. Toute personne infectée court le risque de développer une cirrhose du foie et un cancer du foie.

Les méningocoques sont des bactéries qui peuvent causer la méningite ou l'empoisonnement du sang. Il existe différents types de méningocoques. Le vaccin de rattrapage offert gratuitement protège contre les méningocoques A, C, W et Y.

PapillomaVirus Humain (HPV) contamine de nombreuses personnes. Souvent, cela n'a pas de conséquences graves. Mais le virus peut également être à l'origine, plus tard, de cancers, tels que le cancer du col de l'utérus et le cancer de la gorge. Le vaccin protège contre la plupart des cancers dus au HPV.



Pour en savoir plus sur les vaccins et les maladies, rendez-vous sur www.allesovervaccineren.be

